


# СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ



ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ, НАЗНАЧЕНИЕ

Фазы развития / Вредный объект	-	00	12-13	21	25-29	30-32	33-47	49-59	61-69	71-86	91
	До посева	Посев	2-3 листа	Начало кущения	Середина-конец кущения	Выход в трубку	Трубкавание-флаговый лист	Колошение	Цветение	Молочная-восковая спелость	Полная спелость
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Каменная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян, хлебная жужелица, хлебные блошки, злаковые мухи		<b>ТРИПТИХ</b> (1,0 л/т)									
Мучнистая роса, карликовая ржавчина, сетчатая пятнистость						<b>ПРИВЕНТ</b> (0,5-1,0 кг/га)					
Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, мучнистая роса, ржавчина, ринхоспориоз			<b>ТИТАН</b> (0,5 л/га)								
Септориоз, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз					<b>АЯКС</b> (0,7 л/га)						
Сетчатая пятнистость, ринхоспориоз						<b>ДУЭЛЯНТ</b> (0,3 л/га)					
Злаковые мухи, тли, пьявица			<b>КУНГФУ СУПЕР</b> (0,1-0,2 л/га)								
Злаковые мухи, пьявицы, цикадки, трипсы, стеблевые пилильщики, тли			<b>КУНГФУ</b> (0,15-0,2 л/га)								
Пьявица			<b>АЛЬФА-ЦИПИ</b> (0,1-0,15 л/га), <b>ИМИДЖ</b> (0,06 л/га), <b>ИМИДЖ</b> (0,06 л/га(A)), <b>МОНАРХ</b> (0,03 кг/га)								
Вредная черепашка, злаковые тли, пшеничный трипс, хлебные жуки, хлебные блошки, злаковые мухи, цикадки			<b>ИМИДЖ ПЛЮС</b> (0,08-0,1 л/га)								
Однолетние злаковые сорняки			<b>ЛАМА</b> (0,6-1,0 л/га)								
Однолетние двудольные, многолетние двудольные (включая виды осота, бодяка) сорные растения			<b>АРАБЕСК</b> (0,3-0,5)								
			<b>ДЕВИЗ</b> (0,15-0,3 л/га)								
Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные (бодяк) сорняки			<b>ГРЕНЧ</b> (8-10 г/га)								
Однолетние злаковые и двудольные, многолетние злаковые и двудольные, злостные многолетние сорняки		<b>ЗЕРО</b> (2-8 л/га)									
Однолетние двудольные сорняки, бодяк полевой			<b>КОРРИДА</b> (10-25 г/га)								